

7
Cinq observations De chirurgie, Dont trois
Sur des lésions au crâne; la 4^{ème} Sur une tumeur
Gelatinuse au carpe et metacarpe de la main droite
la dernière Sur un resserrement de l'anus, et ouverture
à l'intestin Rectum et au Vagin, avec chairs fongueuses
qui remplissoient cet intestin, envoyé à l'Académie
Royale de chirurgie.

Première Observation Sur une fracture capillaire
au crâne avec accidents guérie sans l'opération du
trepan.

Les premiers jours du mois de Novembre 1757
une servante de L'hôtel Dieu de la Ville de saint
Florentin tomba par une fenêtre du dit hôtel Dieu de
dix huit pieds de haut sur le pavé la face contre terre,
et resta sur la place sans connaissance. le bruit de sa
chute attira du secours, elle fut mise au lit, et j'eus
appelé sur le champ.

Je trouvai dans l'examen que j'eus de sa tête, une
plaie triangulaire large dans son milieu de plus
d'un pouce de trois livres sur la partie droite du coronal.

Je sentis avec le doigt une petite esquille qui avoit
été enlevée par quelque pointe de pavé. Je la trouvai. elle
avoit été détachée obliquement du bord d'une fracture
que je découvris. Ensuite j'insaisai la plaie et le peri-
crâne que je trouvais détaché et sans adhérence au crâne.

Je pompai le sang et reconnus que la fracture, qui étoit
capillaire, avoit au moins trois pouces de longueur s'étendant
sur le sinus Suralier. Je prolongeai l'incision der-
rière le front et du pericrâne. Je pansai la plaie avec



ARC45
n°122

Dans le dessein d'appliquer le trepan le lendemain
matin, Il étoit alors six heures du soir. Je fis saigner
la malade deux fois du bras le soir même sans que
la connoissance lui revînt. Elle rendoit de sang par les
yeux et les oreilles.

Le lendemain je lui trouvai beaucoup de fièvre,
mais un peu de connoissance. Elle fut saignée du pied
et la connoissance augmenta. Elle se plaignoit de vives
douleurs dans toute la tête. Mais ces douleurs
n'augmenteroient pas lorsqu'on lui faisoit faire quelques
secousses. On réitéra le même jour la saignée du
pied, qui diminua les douleurs de tête et rendit à la
malade une entière connoissance. Deux heures après
cette seconde saignée ses règles qui étoient supprimées
depuis quatre mois reparurent comme à l'ordinaire.
Ce mieux marqué, la commotion dissipée, l'absence de
tous les signes qui peuvent faire juger d'un épanchem-
ent sur le cerveau, m'engagerent à remettre à un
autre temps l'opération que j'avois projetée. La
suppuration s'établit la fièvre cessa.

Le douzième jour de sa chute il lui prit
vers une heure après midi un frisson violent,
fièvre ardente, vomissement, douleurs de tête, délire.
Je ne pus avoir la malade qu'à cinq heures du soir.
A mon arrivée je trouvais que la fièvre et les accidents
étoient diminués, en comparaison de l'exposé qu'on
m'en avoit fait. La connoissance qu'elle avoit perdue
commençoit à revenir, le mal de tête se dissipoit.
Je soupçonnai quelque faute dans le régime, et je
découvris que le matin on lui avoit donné à manger

une soupe, de la bouillie et du Raisin ^{malgré} aussi les
solicitations des sœurs et même du médecin je persistai
à différer le trepan de trois heures. après cet intervalle
je la trouvais beaucoup mieux. Je lui fis donner deux
Lavements, et une eau minérale qui lui fit du bien. le
principal objet de mon attention étoit la plaie et la
fracture, que je ne perdois point de vue. Elles étoient
l'une et l'autre en très bon état. Des chairs grenues
remplissoient toute la circonférence de la plaie, j'en
jugai point à propos d'appliquer le trepan.

À bout de sept semaines il parut le long de la
fracture de petits mamelons charnus qui me firent
espérer une exfoliation prochaine. Cependant elle
ne s'en fit pas si promptement. En examinant attentive-
ment je m'aperçus, que quoique l'os fût très peu
changé de couleur, les lèvres de la plaie enlavoient
la pièce d'os qui devoit s'exfolier. Je passai l'extrémité
d'une feuille de Myrte entre les bords de la plaie
et sous la pièce d'os que je tins en deux portions
et de toute l'étendue de la fracture. Cette exfoliation
n'appartint point, qu'à la première table jusqu'au déployé.
La table vitrée n'ayant aucune part. Quinze jours
après la plaie fut entièrement cicatrisée; la malade
jouit présentement d'une santé parfaite.

M. Quesnai dans son mémoire du trepan dans
les cas douteux (académie Royale de chirurgie tome
1.^{re} 2.^{de} édition in 4.^o page 224) semble blâmer la
conduite des praticiens qui ont guéri des fractures
au Crâne sans trepan, et pense qu'il y a peu de



Sagesse ne pas trepaner dans les fractures du crâne
malgré des observations qui prouvent qu'on a réussi
sans cette opération. Je conviens que la pratique
la plus sûre est d'y avoir recours, lors que les accidents
persistent. Mais ici ils diminuent après quatre
saignées, les règles supprimées reparoissent, le
sans l'imprudence que l'on commit le douzième jour
de la maladie. Il est très vraisemblable que la
malade n'aurait point souffert l'accident, quelle
eût éprouvé. D'ailleurs j'étais persuadé tous les jours et
j'étais opposé de lui faire l'opération au moindre
signe d'épanchement. Il est aisé de conclure que
ce sont les accidents qui déterminent ^{la Pratique} à appliquer
le trepan ou non même dans le cas de fracture
au crâne; et qu'il seroit blâmable s'il se pressoit
d'opérer, ou s'il différeroit trop longtemps à le faire
lors que les accidents menaceroient le malade de
danger.

2^e

Deuxième Observation sur un enfonce-
ment considérable du parietal gauche guéri sans
accidents.

Alu mois d'avril dernier un Garçon de quinze à
seize ans venant du Village de Vergigny à la Ville
de St. Florentin reçut sur le parietal gauche un
coup de boule qui le renversa par terre. Les
Spectateurs le crurent mort et le dirent tout haut.
Le jeune homme en disant qu'il ne l'étoit pas
se releva lui même ramassa son chapeau que le
coup avoit fait tomber, continua son chemin

à la Ville distante d'une lieue, & fu les commissions
dont il étoit chargé et s'en retourna chez lui.

Le lendemain ses parents, qui apprirent le coup
qu'il avoit reçu la veille, l'amenerent à St Florentin chez
un de mes Confères pour le faire saigner. Le chirurgien
examinant l'endroit où le coup avoit porté fut fort
étonné de sentir un enfoncement circulaire large
environ d'un pouce de trois lignes et profond à l'égale
la moitié d'une balle de battoir, sans douleur à la
circonférence de cet enfoncement et sans aucun des
accidents qui suivent ordinairement la compression
du Cerveau. Il le saigna du bras et le malade s'en
retourna à son village à pied. Le soir du même jour
mon Confère me fit part de la remarque qu'il avoit
faite de l'enfoncement du parietal, et me pria d'aller
le lendemain avec lui pour le trepaner. Je lui
représentai que s'il y avoit fracture avec enfoncement
des pièces il falloit qu'il fût des le soir même une
incision cruciale afin de reconnaître la fracture
et d'appliquer le trepan le lendemain, s'il étoit
nécessaire. Il y alla et trouva le blessé sans
aucun accident il ne lui fit rien jusqu'à ce que je
leusse vu. Je m'y transportai le troisième jour de
la blessure. Je le trouvai très gai, ne souffrant
aucune douleur. Mon Confère observa que l'enfonce-
ment n'étoit plus si profond. Je le visitai attentive-
ment et ne découvris aucune fracture, mais
l'enfoncement seul semblable à ceux que nombre
de praticiens nous disent avoir reconnus aux os
du Crâne Sans un âge tendre, où ils n'ont pas



encore acquis toute la solidité dont ils sont
susceptibles. Je comprimai les environs et l'enfoncement
même sans lui causer la moindre douleur. Finalement
il rendit un peu de sang par le nez, ce qui m'engagea
à le faire saigner une seconde fois. Dans le cours du
traitement j'eus l'esperance que l'enfoncement se releveroit
de jour en jour, et après six semaines l'os reprit sa
forme ordinaire sans que le blessé en ait ressenti
la moindre incommodité.

on regardera sans doute cet enfoncement sans
accident comme un Phenomene singulier. Car la partie
du Parietal enfoncé a dû faire intérieurement une saillie
proportionnée à la cavité qui se faisoit sentir à
l'extérieur, qui auroit dû naturellement comprimer la
dure-mère, et occasionner les accidents, qui suivent de cette
compression. On doit aussi regarder l'absence de la
douleur même aux teguments comme une chose rare
après un coup, qui avoit produit un enfoncement si
considérable, cependant il n'a paru ni contusion
ni ecchymose et le malade ne se sent de ce coup en
aucune façon. Je n'entreprendrai point d'expliquer
les raisons de l'absence des accidents qui suivent
de semblables enfoncements. Je me contente d'exposer
simplement le fait qui me paroit peu commun.

3^{me}

Troisième Observation sur une plaie
considérable à la tête avec accidents primitifs
tres graves guérie sans exfoliation des os du
crâne découverts.

Je fus appelé au mois de juillet 1766 pour

vois un jeune homme âgé de 18 ans qui dormant une
cloche à Arbousseaux sa paroisse, le battant se cassa
Sans s'apercevoir supérieure, et tomba perpendiculairement
sur sa tête. au moment qu'il reçut le coup il fut renversé
sans connaissance sur la terre où il resta environ une demi
heure. Le curé étant entré dans l'église trouva le jeune
homme tombé la face contre terre sans connaissance
rendant le sang par les yeux, le nez et les oreilles.

Il fut porté chez ses parents et pansé par le seigneur
du lieu qui vint about par la compression d'arrêter
une hémorragie assez violente. Je me transportai le
lendemain matin et je trouvai le malade dans un assoupis-
sement considérable accompagné de doufflement, sans
connaissance, rendant encore du sang par les oreilles
et les yeux et toute le visage extrêmement gonflé et
echymosé. Je voulus lever l'appareil qui avoit été
appliqué la veille. Mais une effusion considérable de
sang causée par l'ouverture d'un rameau de l'artère
temporale m'engagea à différer jus qu'au soir. Je saignai
deux fois le malade du bras et une fois du pied:
après cette dernière saignée le blessé commença à
prononcer quelques mots qu'on ne comprenoit pas.
Je levai l'appareil qui donna encore un peu de sang.
Mais le point d'appui et l'agaric de chèneuren bien-
tôt arrêté cette hémorragie. Je découvris une plaie
large en rond comme la paume de la main, qui laissoit
découvrir le parietal et une partie du coronal dans
presque toute l'étendue de la dite plaie. Elle avoit
un lambeau que j'appliquai sur les os. Je n'aperçus



aucune fracture. Je crus cette plaie comme une
plaie simple. La fièvre s'animait et la connaissance n'étoit
revenue que très imparfaitement, ce qui me déterminait
faire encore deux saignées au pied et à donner
plusieurs lavements: le lendemain je retournai voir
le malade, que je trouvais presque sans fièvre ayant
tout le jugement possible. Je craignois que la plaie
ne fût très longtemps à guérir et que la portion de parietal
découverte ne s'exfoliat, mais le lambeau quoiqu'exposé
se réunir par une légère suppuration et la plaie se
guérit en trois semaines sans exfoliation, l'os conserva
toujours sa couleur ordinaire, la cicatrice se fit très bien
et je n'eus à combattre que la commotion.

Quatrième observation. Sur une tumeur
considérable au carpe et Metacarpe de la main
droite survenue à une femme âgée de trente six
ans à la suite d'une chute.

Je fus consulté au mois de juillet 1789 pour
une femme qui avoit une tumeur énorme au carpe
et ^{au} metacarpe de la main droite. Son chirurgien
ordinaire me dit qu'elle étoit tombée il y avoit deux
ans sur son poignet qui s'étoit trouvé plié sous
elle; qu'ayant cru avoir le poignet démis, elle s'étoit
fait voir à plusieurs chirurgiens, qui lui avoient fait
des extensions considérables sans qu'elle eût été soulagée,
que le mal avoit toujours augmenté de plus en plus.
Après ce détail il me la fit voir. Je trouvais que cette

seigneur avoit toute la main le carpe et metacarpe d'une
grosseur prodigieuse. Cette tumeur paroissoit comme
le corps d'un enfant nouveau né, la peau garnie de
vaisseaux variqueux sur toute la surface. En touchant
cette tumeur je sentis une fluctuation manifeste. Ce qui
nous déterminâ mon confrère et moy à l'ouvrir. Nous
fûmes fort étonnés de voir au lieu de pus au quel nous
nous attendions, une substance gelatinuse, transparente
semblable à une vraie gelée de bouillon bien faite.

Après avoir évacué une partie de cette humeur, je parcourus
avec les doigts la profondeur de cette tumeur; et j'y trouvai
les os du carpe et du metacarpe cariés au point qu'ils
étoient dénués de toutes capsules, qui étoient détruites
aussi bien que les tendons extenseurs des doigts et le
ligament annulaire. Je pris une partie de ces os que
je tirai sans peine les uns après les autres. Ils étoient
friables comme une terre desséchée. Je pansai la plaie
avec de la charpie sèche. Le lendemain au second
pansement je trouvai toute la plaie remplie de la même
humeur gelatinuse. J'en jettai quatre cuillerées dans de
l'eau chaude qui se mélangea ~~avec l'humeur~~. Je fis
bouillir ce mélange sans que l'humeur parût s'épaissir.
Cependant après que l'eau se fut refroidie elle prit
la consistance d'une gelée de bouillon, sans qu'il y
parût aucune substance lymphatique. J'en pris de
cette eau chargée de cette humeur gelatinuse je
l'étendis dans une grande quantité d'eau chaude,
qui après être refroidie, laissa voir sur la surface
une portion de lymphes par des filaments blancs,



qui surnageoient, comme on voit la limphe surnager dans l'eau d'une saignée du pied.

Je ne sai si on pourroit attribuer aux sucs de cette tumeur la vertu corrosive, qu'ont éprouvé les os, tendons et ligaments. Dis-on que ces sucs gelatineux chargés des sels essentiels du chyle aient acquis par leur séjour un degré d'acrimonie qui a corrodé ces parties comme il arrive dans les tumeurs cancéreuses. Soit que le panchement de quelque humeur ait commencé la maladie, soit qu'il y ait eu fracture de quelques uns des os du carpe ou du metacarpe.

Pour revenir à l'observation principale je continuai quelques jours mes pansements enportant chaque fois quelque portion de carie. Je vins jusqu'à l'articulation du carpe avec le cubitus et le radius les quels je trouvai également cariés. Après en avoir détaché de l'un et de l'autre la longueur d'un ponce. Je me déterminai à amputer le reste de la main qui n'étoit plus qu'une masse informe de chairs fongueuses, de restes de tendons détruits, de doigts dont les phalanges n'étoient plus soutenues. L'amputation n'étoit pas difficile à faire, puis qu'il ne s'agissoit que de couper quelque portion des muscles flechisseurs du poignet et des doigts qui n'étoient pas entièrement détruits. L'opération fut faite, l'artere Radiale donna un peu de sang, qui fut arrêté par la compression et l'agaric. Je pansai la plaie comme une amputation ordinaire. L'extrémité du cubitus et du radius s'exfolioient au bout de

trois semaines^{le} la plaie fut cicatrisée en très peu de temps. Mais cette femme qui étoit grosse deviron cinq mois lors de l'amputation, avoit été atteinte, après une couche fort heureuse d'une dissenterie violente mourue de cette maladie, qui lui dura six semaines et qui résista à toutes les ressources de l'art. On ne peut attribuer sa mort à l'opération puis que la femme avoit été parfaitement guérie, et qu'elle avoit joui d'une très bonne santé jus qu'au temps de son accouchement qui n'arriva qu'à son terme.

5^e Cinquième Observation sur le Retrecissement
Du sphincter de L'anus avec des chairs
fongueuses dans le rectum, avec ouverture à cet Intestin
et au vagin.

Au mois de Juillet 1765 j'eus appelé pour voir
la femme d'un Charpentier de la paroisse de Persey[†]
qui se plaignoit de ne pouvoir aller à la selle que très
difficilement et avec de grandes douleurs, souffrant
continuellement tant aux environs du sphincter de
l'anus que dans la région lombaire. Il y avoit deux
mois qu'elle étoit accouchée, elle ne nourrissoit point son
enfant, et n'avoit pas eu ses règles depuis. Je pensai
d'abord que quelques vaisseaux hemorrhoidaux engorgés
pouvoient être la cause de cette difficulté d'aller à la
selle. Je lui conseillai de se faire tirer du sang du bras
pour diminuer la pléthore et lui prescrivis un régime
rafraichissant et relâchant, le bain, les lavements. Tout
fut exécuté exactement sans que la femme en sentit

[†] village à deux lieues est d'Alençon



aucun soulagement. Ne se trouvant pas mieux de l'usage des remèdes qui la guérissent, elle se livra à des empiriques, dont les uns la saignerent en pied et d'autres lui firent prendre des purgatifs violents qui aggravèrent le mal.

Je la perdis de vue pendant six mois, après lesquels, elle me fut appelée de nouveau. Je l'examinai et trouvai son état bien différent. L'anus étoit dans un spasme qui le resserroit au point qu'on ne pouvoit y introduire la plus petite canule de seringue. Les matières fécales ne passaient plus par cette voie, mais par le Vagin qui étoit percé. Après plusieurs tentatives inutiles je réussis à introduire dans l'anus le doigt indicateur non sans faire beaucoup souffrir la malade; et mon doigt se trouva extrêmement serré. Je découvris dans le Rectum une substance spongieuse qui remplissoit toute la capacité de cet intestin. J'en détruisis une bonne partie, que je détachai avec le doigt le plus loin qu'il me fut possible. Après avoir donné un peu de relâche à la malade, je recommençai et vint à bout de détruire tout ce que je pour atteindre. Je découvris l'ouverture faite au Rectum et au Vagin qui donnoit passage aux matières fécales, et je fis passer sans peine mon doigt d'une de ces parties dans l'autre. Je suis toute la difficulté de guérir une maladie de cette espèce. Comment espérer que l'intestin et le vagin, devenus si percés puissent pas recollément s'adhérer au moyen du tissu cellulaire et fermer leurs ouvertures? C'étoit cependant la première indication que j'avois à remplir pour empêcher les matières fécales de suivre

la route du vagin, et leur faire reprendre la route
ordinaire. Pour y parvenir j'eus une espèce de
suppositoire long de cinq pouces que j'introduisis dans
le Rectum. après l'avoir frotté d'une pommaade dans la
quelle j'avois fait entrer l'extraire de Saturne. J'eus à
bout de détruire les fongus, mais les matières passèrent
toujours par le vagin. Je pris le parti d'introduire
dans cette partie une éponge que je mouillai d'une figure
et que j'induisis de pommaade. J'y attachai un fil double
et cire pour retirer l'éponge plus commodément cette
éponge absorbant de l'humidité de cette partie ferma
exactement l'ouverture. Le le Suppositoire introduit
dans l'unus les matières reprirent la route naturelle.
Mais ce ne fut pas pour longtemps. Le sphincter qui
n'étoit plus retenu par la présence du suppositoire, se
contracta comme auparavant, et refusant le passage
non seulement aux excréments mais même aux vents
les matières revinrent par le vagin, parce que je fus
forcé de retirer l'éponge pour donner passage aux
matières fécales.

Il est aisé de juger de l'état d'une malade qui
rend les excréments involontairement et par cette voie.
Combien sa situation l'afflige et l'empêche de vaquer
à ses affaires. J'ai imaginé un moyen qui sans la
guérir, au moins la soulage. J'ai fait faire un tuyau
d'étain mince long de cinq pouces et à peu près
du diamètre de l'intestin. Je l'ai introduit dans
le Rectum à la faveur d'une bougie que j'ai portée
dans l'anus assez avant. puis j'ai retiré la bougie
et laissé le tuyau d'étain comme on laisse la canule
dans l'opération de la Paracentèse et autres.



de pour lui épargner l'incommode de lâcher
ses matieres continuellement, j'en ai appris à former
la canule avec un bouchon de liège, et à l'ôter quand
elle sent un avoir besoin. Ce moyen ne guerit pas,
je l'avoue, mais au moins il diminue les inconve-
nients, met la Malade en état de vaquer à ses affaires
sans qu'on s'appercive de son état.

J' prie L'Académie de vouloir m'aider de ses
lumières pour guerir radicalement cette maladie,
si elle croit qu'il y ait moyen et j'en ferais un
honneur et un devoir de suivre ses conseils avec
toute l'exactitude possible.

M^r M^r Maître en Chirurgie
Lieutenant de Monsieur le Premier Chirurgien
du Roy à St Florentin, et ancien chirurgien
aide-major des armées dans les deux dernières
guerres.

as. St Florentin ce 15 g^{bre} 1768



